



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 4521 (έντυπο 04), για χορήγηση άδειας σε φυτοπροστατευτικό προϊόν, για το οποίο υποβλήθηκε επιστολή πρόσβασης στα στοιχεία που υποβλήθηκαν για το πανομοιότυπο αδειοδοτημένο προϊόν Poleci με αριθμό άδειας 2898,
- την αίτηση με αρ. 774 (Έντυπο 09), για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την επιστολή του αιτητή, ημερομηνίας 28/07/2023, για τροποποίηση της άδειας σε σχέση με το εμπορικό όνομα του σκευάσματος,
- την αίτηση με αρ. 876 (Έντυπο 09), για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος και την επιστολή του αιτητή, ημερομηνίας 17/06/2024, για τροποποίηση της άδειας σε σχέση με τον Υπεύθυνο διάθεσης στην αγορά και τον διανομέα,
- την αίτηση με αρ. 4991 (Έντυπο 08) για παράταση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος,
- την αίτηση με αρ. 241 (Έντυπο 10), για τροποποίηση άδειας φυτοπροστατευτικού προϊόντος, σε σχέση με το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή, λόγω αλλαγής των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (MRLs) για τη δ.ο. deltamethrin, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2024/1342,

τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν
DESHA..... ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

3958

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/10/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Sharda Cropchem España S.L

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

L. Lambrou Agro Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

L. Lambrou Agro Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Desha

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: deltamethrin 2,5 % β/ο
βοηθητικές ουσίες : 97,13 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Sharda Cropchem Limited

5. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

1. GUJARAT Pesticides, Ινδία
2. AGROLOGY Παπαοικονόμου ABEE, Σίνδος, Θεσσαλονίκη
3. SAFAPACK Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
4. IRCA SERVICE SPA, Ιταλία
5. Laboratorios Alcotan, Ισπανία
6. Chemark Kft, Ουγγαρία

6. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:

1. AGROLOGY Παπαοικονόμου ABEE, Σίνδος, Θεσσαλονίκη
2. SAFAPACK Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
3. IRCA SERVICE SPA, Ιταλία
4. Laboratorios Alcotan, Ισπανία
5. Chemark Kft, Ουγγαρία
6. Chemia SPA, Ιταλία

7. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	10ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 3L, 5L και 10L	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/EVOH ή HDPE/PA) με καπάκι ασφαλείας

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία:

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

4. Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.:

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες
ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή: - Πορτοκαλιά CIDS - Γκρέιπ-φρουτ CIDPA - Νεραντζιά CIDAU	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE)	30 – 50		30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	1
	Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> - SAISOL) Μύγα της Μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i> - CERTCA) Αλευρώδης (<i>Aleurothrixus floccosus</i> - ALTHFL)	50	100	50		
	Πράσινη αφίδα (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE)	30		30		
Εσπεριδοειδή: - Λεμονιά CIDLI - Μανταρινιά CIDRE						
Μηλοειδή*: - Μηλιά MABSD - Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαπα της μηλιάς (<i>Laspeyresia pomonella</i> - CARPPO) Αφίδες (<i>Aphis pomi</i> - APHIPO, <i>Dysaphis plantaginea</i> - DYSAPL) Ψύλλα μηλιάς (<i>Psylla mali</i> - PSYLMA) Ανθονόμος (<i>Anthonomus pomorum</i> - ANTHPO, <i>Anthonomus spilotus</i> - ANTHSL) Μηλολόνθη (<i>Melolontha melolontha</i> - MELOME) Κηκιδόμυγες (<i>Dasineura mali</i> - DASYMA) Θρίπες (<i>Thrips</i> sp. - THRISP)	30 – 50*	100	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 14 ημέρες

	Φυλλοδέτεες (<i>Adoxophyes orana</i> - CAPURE, (<i>Archips rosanus</i> – CACORO)	35		35 – 50		
	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Psylla pyri</i> - PSYLPC)	50 (75)	100	50		
	Ψώρα Σαν Ζοσέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE)	50 – 70		50 – 70	Καλοκαιρινοί ψεκασμοί κατά κινητών μορφών	1
Πυρηνόκαρπα: - Ροδάκινιά PRNPS - Νεκταρινιά - Βερικοκιά PRNAR - Δαμασκηλιά PRNDO - Κερασιά PRNAV	Φυλλοδέτεες (<i>Adoxophyes orana</i> - CAPURE, (<i>Archips rosanus</i> – CACORO) Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i> – ANARLI)	35		35 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
	Ραγολέτιδα (μύγα κερασιού) (<i>Rhagoletis cerasi</i> - RHAGCE)	40 – 50		40 – 70		
	Μύγα της μεσογείου (<i>Ceratitis capitata</i> - CERTCA)	50	100-140	50 – 70		
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE), <i>Myzus cerasi</i> - MYZUCE, <i>Hyalopterus pruni</i> - HYALPR) Καρπόκαψα της Δαμασκηλιάς (<i>Laspeyresia funebrana</i> - LASPFU)	30 – 50		30 – 70		
	Ψώρα Σαν Ζοσέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE)	50 – 70	100	50 – 70	Καλοκαιρινοί ψεκασμοί κατά κινητών μορφών	
	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i> – POLYBO)	50 (1 ^η γενεά) 50 – 70 (2 ^η & 3 ^η γενεά)	100	50 – 70	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	3 / 14 ημέρες
Αμπέλι** VITVI	Κοχυλίδα (<i>Clysia ambiguella</i> – CLYSAM)	50 – 70		50 – 70		

	Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> sp. - EMPOSP) Πυραλίδα (<i>Sparganothis pilleriana</i> - SPARPI) Τσιγαρολόγος (<i>Byctiscus betulae</i> - BYCTBE) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.- AGROSP)	50		50	50	50 – 70	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες	1		
Ελιά OLVEU	Δάκος (<i>Bactrocera oleae</i> – DACUOL)	50		50	50	50 – 70	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.			
	Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> – SAISOL) Θρίπες (<i>Thrips</i> sp. - THRISP)	50		50	50	50 – 70	Με την εμφάνιση των προσβολών.			
	Βαμβακάδα (<i>Euphyllura</i> spp. – EUPHSP)	30 – 50	100-140	30 – 70	Στην έναρξη της άνθησης (ανθόβια γενεά) ή αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά)					
	Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i> – PRAYOL)	30 (ανθόβια γενεά) 50 (καρπόβ. γενεά)	100-140	30 – 70						
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Αφίδες (<i>Aphis</i> spp. - APHISP)	50	50-100	25 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων-προσβολών	3 / 14 ημέρες				
Κρεμμύδι ALLCE Πράσο ALLPO Καρότο DAUCA	Αφίδες (<i>Aphis</i> spp. - APHISP) Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> - THRITB) Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.- AGROSP)	--	40-50	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2 / 14 ημέρες				
Τομάτα (Υ) LYPES Πιπεριά (Υ+Θ) CPSPAN Μελιτζάνα (Υ)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i> - HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp.- SPODSP) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> –	50	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)	30 – 50 (Υ) 30 – 70 (Θ)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	Υπαίθρου: 3 / 14 ημέρες Θερμοκηπίου: 4 / 7 ημέρες				

SOLME	LPTNDE) Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> - APHIGO, <i>Anuraphis cardui</i> - BRDSCA, (<i>Hyperomyzus lactucae</i> – HYPELA)					
	Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i> – NEZAVI)	30	60 – 100 (Y) 60 – 140 (Θ)	18 – 30 (Y) 18 – 42 (Θ)		
	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA)	70 (Θ)	60 – 140 (Θ)	42 – 70 (Θ)		
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. - AGROSP)	--	60 – 100 (Y)	30 – 50 (Y)		
Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i> - HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp. - SPODSP) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> - APHIGO, <i>Anuraphis cardui</i> - BRDSCA, (<i>Hyperomyzus lactucae</i> – HYPELA)	50	60-100	30 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	3 / 7 ημέρες
	Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i> – NEZAVI)	30	60-140	18 – 42		
Αγγούρι (Y+Θ) CUMSA	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i> - HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp. - SPODSP) Αφίδες (<i>Aphis</i> sp. – APHISP, (<i>Hyperomyzus lactucae</i> – HYPELA)	50	60 – 100 (Y) 60 – 140 (Θ)	30 – 50 (Y) 30 – 70 (Θ)	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	3 / 7 ημέρες
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp. - AGROSP)	--	60 – 100 (Y)	30 – 50 (Y)		
Μαρούλι (Y)	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> –	50	50-100	25 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων	2 / 7 ημέρες

LACSA	HELIAR) Σποντόπτερα (Spodoptera sp. - SPODSP) Άλτης (Chrysodeixis chalcites – PLUSCH) Αφίδες (Hyperomyzus lactucae - HYPELA, (Aphis sp.- APHISP, Nasonovia ribisnigri - NASORN)				προσβολών	
	Κοφτοσκούληκα (Agrotis sp. – AGROSP)	--		30 – 50		
Φύλλα σέλινου APUGV Ρόκα ERUVE	Αφίδες (Aphis sp. – APHISP) Σποντόπτερα (Spodoptera exigua – SPODEX) Μαμέστρα (Mamestra sp. – MAMESP) Άλτης (Chrysodeixis chalcites – PLUSCH)	50	70	35	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 14 ημέρες
	Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp. – AGROSP)	--		30 – 50		
Μπιζέλι/Αρακάς PIBSX	Αφίδα των μιτζελιών (Acyrtosiphon pisum – ACYRON) Σιτόνα (Sitona sp. – SITNSP)			25		
	Αφίδα των κουκιών (Aphis fabae – APHIFA) Κάμπιες (Laspeyresia sp. – LASPSL) Θρίπες (Thrips tabaci - THRITB, (Thrips angusticeps – THRIAN) Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp. – AGROSP)	--	100	30 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 14 ημέρες
Ψυχανθή: - Φασόλια PHSVX - Κουκιά	Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera – HELIAR) Αφίδες (Myzus persicae - MYZUPE,	--	60	25 – 30	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και έως την αρχή της άνθησης	2 / 14 ημέρες

VICFX	Aphis spp. – APHISP) Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp. – AGROSP)		50-100	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	
Σπαράγγι ASPOF	Προνένια (Spodoptera spp.) Αφίδες Θρίπας (Thrips tabaci - THRITB)	--	100	30-50	Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 7 ημέρες
Μανιτάρια AGARBI	Δίπτερα	30-50	100	30-50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	1
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος (Leptinotarsa decemlineata – LPTNDE	--	60	50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	3 / 14 ημέρες
	Σποντόπτερα (Spodoptera sp. - SPODSP)			30 – 50		
Βαμβάκι GOSHI	Ρόδινο σκουλήκι (Pectinophora gossypiella – PECTGO) Πράσινο σκουλήκι (Helicoverpa armigera – HELIAR)	--	30-50	50-70	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 14 ημέρες
	Αλευρώδης (Bemisia tabaci – BEMITA)			50		
	Τζιτζικάκια (Empoasca spp. – EMPOSP)			30-50		
	Σποντόπτερα (Spodoptera sp. – SPODSP) Αφίδα (Aphis gossypii – APHIGO) Κοφτοσκούληκα (Agrotis sp. – AGROSP)					
Καπνός NIOTA	Αφίδες Θρίπας (Thrips tabaci – THRITB) Κοφτοσκούληκα (Agrotis spp. – AGROSP) Επίτιριξ (Epitrix spp. - EPIXSP)	---	50 – 100	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	3 / 7 ημέρες

Ελαιοκράμβη BRSNN	Αφίδες Λεπιδοπτερα (<i>Meligetes aenes</i> , <i>Psylliodes chrysocephala</i> , <i>Phyllotreta nemorum</i>) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	--	20-40	20-30	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και έως την αρχή της άνθισης	1
	Αφίδες (<i>Aphis fabae</i> - APHIFA, <i>Myzus persicae</i> - MYZUPE) Μύγα των τεύτλων (<i>Pegomya</i> spp. - PEGOSP) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> - CHAETI) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp. - AGROSP) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp. - SPODSP) Κλεονός (<i>Cleonus mendicatus</i> - CLEOMN) Κασσίδα (<i>Cassida nebulosa</i> - CASSNE)	--	50	30 - 50 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	1
Ζαχαρότευτλα BEAVA	Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i> - PYRUNU) Σεξάμια (<i>Sesamia</i> sp. - SESANO) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> - HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp. - SPODSP) Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> - RHOPPA, (<i>Sitobion avenae</i> - MACSAV) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp. - AGROSP) Διαβρώπια (<i>Diabrotica virgifera</i> - DIABVI)	--	60	30-50 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	3 / 14-21 ημέρες
Καλαμπόκι*** ZEAMX						

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εσπεριδοειδή, Βαμβάκι, Καλαμπόκι, Σιτηρά, Ζαχαρότευτλα	30 ημέρες
Μηδική	14 ημέρες
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι, Ελιά, Κρεμμύδι, Πράσο, Καρότο, Πατάτα, Μαρούλι, Μπιζέλι/Αρακάς, Καπνός, Φύλλα Σέλινου	7 ημέρες
Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά Αγγούρι, Ρόκα, Μανιτάρι	3 ημέρες
Σπαράγγι, Όσπρια (Φασόλι, Κουκιά), Ελαιοκράμβη	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Καλλωπιστικά (Υ+Θ)	Μη εφαρμόσιμο

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3Α

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με Desha. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:


γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας

10. Συνδυαστικότητα: ----

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:



12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

- H226** Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
- H304** Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.
- H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- H336** Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
- H410** Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

- P405+P102** Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
- P210** Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.
- P261** Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
- P270** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
- P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
- SP1** Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
- Spe3** Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και την ελιά, **20 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπελιού και **10 μέτρων** για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες.
- Spe3** Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.
- Spe8:** **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.
Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.
- EUH401** Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το σκεύασμα καταστρέφεται σε ειδικούς υψικαμίνους

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

1. Όσες ποσότητες του σκεύασματος, με την παλιά ετικέτα, υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για τη νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα.

2. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 17/01/2025.....



Σφραγίδα

Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας