



ΟΙ ΠΕΡΙ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ 2021
(N 141(I)/2011 και N 71(I)/2021)

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Την αίτηση με αρ. 5020-P (Έντυπο 07), για ανανέωση άδειας παράλληλου εμπορίου φυτοπροστατευτικού προϊόντος,

τροποποιείται η άδεια παράλληλου εμπορίου στο φυτοπροστατευτικό προϊόν POLECI
2,5EC..... ως ακολούθως:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

4003-P

Ημερομηνία τροποποίησης άδειας:

31/10/2024

Ημερομηνία λήξης άδειας:

15/08/2027

2. Κάτοχος της άδειας:

Solato Trading Ltd

3. Υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά:

Solato Trading Ltd

(εφόσον είναι διαφορετικός από τον
κάτοχο άδειας)

4. Διανομέας / Διανομείς:

Solato Trading Ltd

Β) Ταυτότητα του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Εμπορικό Όνομα: Poleci 2,5EC

2. Μορφή: Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)

3. Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος: deltamethrin 2,5 % β/ο
βοηθητικές ουσίες : 97,13 % β/β

4. Παρασκευαστής σκευάσματος: Sharda Cropchem Limited

5. Συσκευασίες με τις οποίες το προϊόν θα διατίθεται στην αγορά:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1	Φιάλες	10ml, 50ml, 100ml, 250ml, 500ml, 1L, 3L, 5L και 10L	Πλαστικό τύπου COEX (HDPE/EVOH ή HDPE/PA) με καπάκι ασφαλείας

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: deltamethrin

2. Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 98,5% w/w

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Sharda Cropchem Limited

Δ) Στοιχεία για τη Χρήση του Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος

1. Κατηγορία και Τρόπος Δράσης:

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο επαφής και στομάχου για την αντιμετώπιση μυζητικών και μασητικών εντόμων. Το deltamethrin δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων και συγκεκριμένα στις διαύλους των ιόντων Na στις προσυναπτικές μεμβράνες των νευρικών κυττάρων

2. Προορίζεται για: επαγγελματίες χρήστες



ερασιτέχνες χρήστες



3. Τρόπος Εφαρμογής:

Ψεκασμός φυλλώματος

4. Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού διαλύματος:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μέχρι τη μέση με νερό και βάλτε τον αναδευτήρα σε λειτουργία. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος και συμπληρώστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

5. Φάσμα Δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις			Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αρ. εφαρμογών ανά καλλιεργ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών
		κ.εκ. /100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού (λίτρα / δεκ.)	κ.εκ. σκ./δεκ. μέγιστη		
Εσπεριδοειδή: - Πορτοκαλιά CIDS1 - Γκρέιπ-φρουτ CIDPA - Νεραντζιά CIDAU	Πράσινη αφίδα <i>(Myzus persicae - MYZUPE)</i>	30 – 50		30 – 50		
	Λεκάνιο <i>(Saissetia oleae - SAISOL)</i> Μύγα της Μεσογείου <i>(Ceratitis capitata - CERTCA)</i> Αλευρώδης <i>(Aleurothrixus floccosus - ALTHFL)</i>	50	100	50	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	1
	Πράσινη αφίδα <i>(Myzus persicae - MYZUPE)</i>	30		30		
Μηλοειδή*: - Μηλιά MABSD - Αχλαδιά PYUCO	Καρπόκαψα της μηλιάς <i>(Laspeyresia pomonella - CARPPO)</i> Αφίδες <i>(Aphis pomi - APHIPO, Dysaphis plantaginea - DYSAPL)</i> Ψύλλα μηλιάς <i>(Psylla mali - PSYLMA)</i> Ανθονόμος <i>(Anthonomus pomorum – ANTHPO, Anthonomus spilotus – ANTHSL)</i> Μηλολόνηθ <i>(Melolontha melolontha - MELOME)</i> Κηκιδόμυγες <i>(Dasineura mali - DASYMA)</i>	30 – 50*	100	30 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 14 ημέρες

	Θρίπες (<i>Thrips</i> sp. - THRISP)					
	Φυλλοδέτεες (<i>Adoxophyes orana</i> - CAPURE, (<i>Archips rosanus</i> - CACORO)	35		35 – 50		
	Ψύλλα αχλαδιάς (<i>Psylla pyri</i> - PSYLPC)	50 (75)	100	50		
	Ψώρα Σαν Ζοσέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE)	50 – 70		50 – 70	Καλοκαιρινοί ψεκασμοί κατά κινητών μορφών	1
Πυρηνόκαρπα: - Ροδάκινιά PRNPS - Νεκταρινιά - Βερικοκιά PRNAR - Δαμασκηλιά PRNDO - Κερασιά PRNAV	Φυλλοδέτεες (<i>Adoxophyes orana</i> - CAPURE, (<i>Archips rosanus</i> - CACORO) Ανάρσια (<i>Anarsia lineatella</i> – ANARLI)	35		35 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	1
	Ραγολέπτα (μύγα κερασιού) (<i>Rhagoletis cerasi</i> - RHAGCE)	40 – 50	100-140	40 – 70		
	Μύγα της μεσογείου (<i>Ceratitidis capitata</i> - CERTCA)	50		50 – 70		
	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE), <i>Myzus cerasi</i> - MYZUCE, <i>Hyalopterus pruni</i> - HYALPR) Καρπόκαψα της Δαμασκηλιάς (<i>Laspeyresia funebrana</i> - LASPFU)	30 – 50		30 – 70		
	Ψώρα Σαν Ζοσέ (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> - QUADPE)	50 – 70	100	50 – 70	Καλοκαιρινοί ψεκασμοί κατά κινητών μορφών	
	Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i> – POLYBO)	50 (1 ^η γενεά) 50 – 70 (2 ^η & 3 ^η γενεά)	100	50 – 70	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα	3 / 14 ημέρες
Αμπέλι** VITVI						

Ελιά OLVEU	Κοχυλίδα (<i>Clysia ambigua</i> – CLYSAM)	50 – 70	100-140	50 – 70	Σύμφωνα με τις συλλήψεις των ακμαίων στις παγίδες	1
	Τζιτζικάκια (<i>Empoasca</i> sp. - EMPOSP)	50				
	Πυραλίδα (<i>Sparganothis pilleriana</i> - SPARPI)					
	Τσιγαρολόγος (<i>Byctiscus betulae</i> - BYCTBE)					
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.- AGROSP)					
Δάκος (<i>Bactrocera oleae</i> – DACUOL)	50	50 – 70	Μόλις εμφανιστούν τα πρώτα έντομα.			
Λεκάνιο (<i>Saissetia oleae</i> – SAISOL)	50	30 – 70	Με την εμφάνιση των προσβολών.			
Θρίπες (<i>Thrips</i> sp. - THRISP)	30 – 50	30 – 70	Στην έναρξη της άνθησης			
Βαμβακάδα (<i>Euphyllura</i> spp. – EUPHSP)	30 (ανθόβια γενεά)	30 – 70	(ανθόβια γενεά)			
Πυρηνοτρήτης (<i>Prays oleae</i> – PRAYOL)	50 (καρπόςβ. γενεά)		ή αμέσως μετά την καρπόδεση (καρπόβια γενεά)			
Φράουλα (Υ+Θ) FRAAN	Αφίδες (<i>Aphis</i> spp. - APHISP)	50	50-100	25 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων εντόμων-προσβολών	3 / 14 ημέρες
Κρεμμύδι ALLCE Πράσο ALLPO Καρότο DAUCA	Αφίδες (<i>Aphis</i> spp. - APHISP) Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> - THRITB) Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp.- AGROSP)	--	40-50	30 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	2 / 14 ημέρες

Τομάτα (Υ) LYPES Πιπεριά (Υ+Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ) SOLME	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i> - HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp.- SPODSP) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> - APHIGO, <i>Anuraphis cardui</i> - BRDSCA, (<i>Hyperomyzus lactucae</i> – HYPELA)	50	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)	30 – 50 (Υ) 30 – 70 (Θ)	Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών	Υπαιθρου: 3 / 14 ημέρες Θερμοκηπίου: 4 / 7 ημέρες
	Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i> – NEZAVI)	30	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)	18 – 30 (Υ) 18 – 42 (Θ)		
	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA)	70 (Θ)	60 – 140 (Θ)	42 – 70 (Θ)		
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. - AGROSP)	--	60 – 100 (Υ)	30 – 50 (Υ)		
	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i> - HELIAR) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> spp.- SPODSP) Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Aphis gossypii</i> - APHIGO, <i>Anuraphis cardui</i> - BRDSCA, (<i>Hyperomyzus lactucae</i> – HYPELA)	50	60-100	30 – 50		
Τομάτα (Θ) LYPES Μελιτζάνα (Θ) SOLME	Βρωμούσα (<i>Nezara viridula</i> – NEZAVI)	30	60-140	18 – 42	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	3 / 7 ημέρες

Αγγούρι (Υ+Θ) CUMSA	Πράσινο σκουλήκι (<i>Heliothis armigera</i> - HELIAR) Σπονιόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp. - SPODSP) Αφίδες (<i>Aphis</i> sp. - APHISP, (<i>Hyperomyzus lactucae</i> – HYPELA)	50	60 – 100 (Υ) 60 – 140 (Θ)	30 – 50 (Υ) 30 – 70 (Θ)	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	3 / 7 ημέρες
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp. - AGROSP)	--	60 – 100 (Υ)	30 – 50 (Υ)		
Μαρούλι (Υ) LACSA	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Σπονιόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp. - SPODSP) Άλτης (<i>Chrysodeixis chalcites</i> – PLUSCH) Αφίδες (<i>Hyperomyzus lactucae</i> - HYPELA, (<i>Aphis</i> sp. - APHISP, (<i>Nasonovia ribisnigri</i> - NASORN)	50	50-100	25 – 50	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 7 ημέρες
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp. – AGROSP)	--		30 – 50		
Φύλλα σέλινου APUGV Ρόκα ERUVE	Αφίδες (<i>Aphis</i> sp. – APHISP) Σπονιόπτερα (<i>Spodoptera exigua</i> – SPODEX) Μαμέστρα (<i>Mamestra</i> sp. – MAMESP) Άλτης (<i>Chrysodeixis chalcites</i> – PLUSCH)	50	70	35	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 14 ημέρες
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP)	--		30 – 50		

Μπιζέλι/Αρακάς PIBSX	Αφίδα των μπιζελιών (<i>Acyrtosiphon pisum</i> – ACYRON) Σιτόνα (<i>Sitona</i> sp. – SITNSP)	--	100	25	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 14 ημέρες
	Αφίδα των κουκιών (<i>Aphis fabae</i> – APHIFA) Κάμπιες (<i>Laspeyresia</i> sp. – LASPSL) Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i> - THRITB, <i>Thrips angusticeps</i> – THRIAN) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP)			30 – 50		
Ψυχανθή: - Φασόλια PHSVX - Κουκιά VICFX	Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR) Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE, <i>Aphis</i> spp. – APHISP) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP)	--	60	25 – 30	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών και έως την αρχή της άνθισης	2 / 14 ημέρες
			50-100	30-50	Με την εμφάνιση των προσβολών.	
Σπαράγγι ASPOF	Προντένια (<i>Spodoptera</i> spp.) Αφίδες Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> - THRITB)	--	100	30-50	Εφαρμογές μετά τη συγκομιδή με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 7 ημέρες
Μανιτάρια AGARBI	Δίπτερα	30-50	100	30-50	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	1
Πατάτα SOLTU	Δορυφόρος (<i>Leptinotarsa decemlineata</i> – LPTNDE) Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp.- SPODSP)	--	60	50	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	3 / 14 ημέρες
				30 – 50		
Βαμβάκι GOSHI	Ρόδινο σκουλήκι (<i>Pectinophora gossypiella</i> – PECTGO) Πράσινο σκουλήκι	--	30-50	50-70	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 14 ημέρες

	(<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR)					
	Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i> – BEMITA)					
	Τζιτζικακία (<i>Empoasca</i> spp. – EMPOSP)	50				
	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp. – SPODSP)					
	Αφίδα (<i>Aphis gossypii</i> – APHIGO)	30-50				
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp. – AGROSP)					
Καπνός NIOTA	Αφίδες Θρίπας (<i>Thrips tabaci</i> – THRITB)					
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> spp. – AGROSP)		50 – 100	---		
	Επίτρινξ (<i>Epitrix</i> spp. - EPIXSP)					3 / 7 ημέρες
Ελαιοκράμβη BRSNN	Αφίδες Λεπιδόπτερα (<i>Meligetes aenes</i> , <i>Psylliodes chrysocephala</i> , <i>Phyllotreta nemorum</i>)					
	Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i>)	20-30	20-40	--		1
Ζαχαρότευτλα BEAVA	Αφίδες (<i>Aphis fabae</i> - APHIFA, <i>Myzus persicae</i> – MYZUPE)					
	Μύγα των τεύτλων (<i>Pegomya</i> spp. – PEGOSP)					
	Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> – CHAETI)	30 – 50	50	--		1
	Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp. – AGROSP)					
	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp. – SPODSP)					

	Κλεονός (<i>Cleonus mendicus</i> - CLEOMN) Κασσιδα (<i>Cassida nebulosa</i> - CASSNE)				50	
Καλαμπόκι*** ZEAMX	Πυραλίδα (<i>Ostrinia nubilalis</i> – PYRUNU) Σεξάμια (<i>Sesamia</i> sp. – SESANO) Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> – HELIAR)	--	60	30-50	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	3 / 14-21 ημέρες
	Σποντόπτερα (<i>Spodoptera</i> sp. – SPODSP) Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> – RHOPPA, (<i>Sitobion avenae</i> – MACSAV) Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp. – AGROSP)			50		
	Διαβρώτικα (<i>Diabrotica virgifera</i> – DIABVI)					
Σιτάρι TRZAX Κριθάρι HORVX	Αφίδες (<i>Rhopalosiphum padi</i> , <i>Sitobion avenae</i>), Κοφτοσκούληκα (<i>Agrotis</i> sp. - AGROSP)	--	20 – 40	25 – 30	ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών	2 / 14-21 ημέρες
Μηδική MEDSA	Αφίδα των μπιζελιών (<i>Acyrtosiphon pisum</i> – ACYRON) Σκαθάρι των μπιζελιών (<i>Apion pisi</i> – APIOPI) Φυτονόμος (<i>Hypera</i> spp.)	-	40	25	5 – 10 ημέρες μετά την κοπή.	2

Καλλωπιστικά (Υ+Θ) NNZZ	Αφίδες (<i>Myzus persicae</i> - MYZUPE) Θρίπες (<i>Thrips tabaci</i> - THRITB) Αλευρώδης (<i>Bemisia tabaci</i> - BEMITA) Μηλολώνθη (<i>Melolontha melolontha</i> - MELOME) Κάμπια γαρυφάλλου (<i>Cacoecimorpha prunubana</i> - TORTPR)	50	50 – 100	25 – 50	Ψεκασμός με την εμφάνιση των πρώτων προσβολών 2 / 14 ημέρες
	Φυλλοδέτεες (<i>Adoxophyes orana</i> - CAPURE, <i>Archips rosanus</i> - CACORO, <i>Pandemis</i> sp. - PANDSP)	35		17,5 – 35	
	Αλευρώδης (<i>Trialeurodes vaporariorum</i> - TRIAVA)	75	70	50	
Παρατηρήσεις:					
*ΠΡΟΣΟΧΗ: Στα μηλοειδή η δόση των 50 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψ.υγ. πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα με τον μικρό όγκο ψεκαστικού υγρού (100 λίτρα/δεκ.) έτσι ώστε η τελική δόση του σκευάσματος να μην ξεπερνάει τα 50 κ.εκ. σκευάσματος στο δεκάριο.					
** Δεν επιτρέπεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων στα οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα.					
*** Η εφαρμογή του στο καλαμπόκι οδηγεί στη μείωση των επιπέδων των μυκοτοξινών, ως αποτέλεσμα επιτυχούς αντιμετώπισης των εντόμων <i>Ostrinia</i> sp. και <i>Sesamia</i> sp.					

6. Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:

Καλλιέργειες	Χρόνος Ασφάλειας
Εσπεριδοειδή, Βαμβάκι, Καλαμπόκι, Σιτηρά, Ζαχαρότευτλα	30 ημέρες
Μηδική	14 ημέρες
Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Αμπέλι, Ελιά, Κρεμμύδι, Πράσο, Καρότο, Πατάτα, Μαρούλι, Μπιζέλι/Αρακάς, Καπνός, Φύλλα Σέλινου	7 ημέρες
Φράουλα, Τομάτα, Μελιτζάνα, Πιπεριά Αγγούρι, Ρόκα, Μανιτάρι	3 ημέρες
Σπαράγγι, Όσπρια (Φασόλι, Κουκιά), Ελαιοκράμβη	Καθορίζεται από το χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος
Καλλωπιστικά (Υ+Θ)	Μη εφαρμόσιμο

7. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το φυτοπροστατευτικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Ομάδα Τρόπου Δράσης: 3Α

- Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο
- Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς
- Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό
- Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με Polec 2,5EC. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης
- Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων με τη γρήγορη μέθοδο της αντικειμενοφόρου πλάκας, ειδικό σύστημα μικροδοκιμής, έτσι ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας.
- Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας

8. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και -

α) σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

β) σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

γ) της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το φυτοπροστατευτικό προϊόν:

9. Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας


10. Συνδυαστικότητα: ----

11. Εικονογράμματα Κινδύνου:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS02



GHS05



GHS07



GHS09



GHS08

12. Δηλώσεις Επικινδυνότητας:

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

H304 Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.

H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις

13. Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P210 Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε.

P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

SP1 Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Spe3 Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **30 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα για τις δένδρως καλλιέργειες και την ελιά, **20 μέτρων** για την καλλιέργεια του αμπελιού και **10 μέτρων** για τα λαχανικά και τις λοιπές καλλιέργειες.

Spe3 Για να προστατέψετε μη στοχευόμενα αρθρόποδα να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας **5 μέτρων** από μη γεωργική γη.

Spe8: **Επικίνδυνο για τις μέλισσες.** Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Μετά την εφαρμογή οι μέλισσες πρέπει να παραμένουν στις κυψέλες τους για μια ημέρα εξασφαλίζοντας τροφή και νερό εντός της κυψέλης ή να απομακρυνθούν οι κυψέλες.

EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

14. Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P331: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P303+P361+P353: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία

Τηλ. Κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

Ε. Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον από την ημερομηνία παρασκευής του, όταν αποθηκεύεται, στην αρχική του, κλειστή συσκευασία, σε χώρο ξηρό, δροσερό, και καλά αεριζόμενο προστατευόμενο από ακραίες θερμοκρασίες και το άμεσο ηλιακό φως

ΣΤ. Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν με τρύπημα ή σχίσσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε ειδικά σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Το σκεύασμα καταστρέφεται σε ειδικούς υψικαμίνους

Ζ. Άλλες πληροφορίες / υποχρεώσεις:

ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Η άδεια παράλληλου εμπορίου χορηγείται στο προϊόν Poleci 2.5EC που είναι αδειοδοτημένο στην Ελλάδα με εμπορικό όνομα Poleci 2.5EC και αριθμό έγκρισης 14408 και με κάτοχο άδειας την εταιρεία Sharda Cropchem Espana S.L.

Το προϊόν αναφοράς στην Κύπρο, βάσει του οποίου χορηγείται η σχετική άδεια, είναι το Poleci 2.5EC με αριθμό άδειας 2898.

Η εταιρεία Solato Trading Ltd, οφείλει να τηρεί αρχείο (Αρχείο Εισαγωγής Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Παράλληλου Εμπορίου) με τις ποσότητες του σκευάσματος Poleci 2.5EC που εισάγονται στην Κύπρο (θα περιλαμβάνει όλα τα παραστατικά στοιχεία των εισαγωγών ανά παρτίδα σκευάσματος).

Το αρχείο θα είναι άμεσα διαθέσιμο για έλεγχο από την αρμόδια Αρχή.

Για κάθε φορτίο του σκευάσματος Poleci 2.5EC που εισάγεται στην Κύπρο θα πρέπει να χορηγείται η σχετική «Άδεια για Εισαγωγή Φυτοπροστατευτικού Προϊόντος Παράλληλου Εμπορίου». Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή του σκευάσματος στη χώρα.

Η ετικέτα του σκευάσματος θα φέρει ευανάγνωστα τη φράση «**ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ**» με τα πλέον έντονα και μεγάλα γράμματα.

Η άδεια παράλληλου εμπορίου θα ανακληθεί:

- σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας του προϊόντος αυτού στην Ελλάδα για λόγους ασφάλειας ή

αποτελεσματικότητας.

- σε περίπτωση κακού χειρισμού της άδειας παράλληλου εμπορίου από την εταιρεία Solato Trading Ltd, με στόχο την εισαγωγή ή τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων άλλων από αυτά για τα οποία χορηγήθηκε η παρούσα άδεια.

1. Όσες ποσότητες του σκευάσματος, με την παλιά ετικέτα, υπάρχουν στα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων, ο υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, για να ενημερώσει για τη νέα άδεια τα καταστήματα πώλησης γεωργικών φαρμάκων που έχουν ήδη προμηθευτεί το σκεύασμα.

2. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή διαπιστωθεί παράβαση των προνοιών των περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμων του 2011 και 2021.

Ημερομηνία: 28/03/2025



Δρ Μάκης Αντωνιάδης
Διευθυντής
Τμήματος Γεωργίας

Σφραγίδα