




ΦΤΕΡΩΤΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ FEATHERED RESIDENTS OF CYPRUS



1. Πέρδικα (Alectoris chukar)

Ζει μόνιμα στην Κύπρο και μπορεί να παρατηρηθεί σε όλες σχεδόν τις περιοχές.

Τρέφεται με σπόρους, χόρτα, καρπούς δέντρων και θάμνων καθώς και με έντομα. Γεννά 8-15 αυγά συνήθως που τα κλωσσά το θηλυκό για 24 περίπου μέρες. Θηρεύσιμο είδος.

1. Chukar (Alectoris chukar)

A permanent resident of Cyprus. It can be found in almost every part of the island. It feeds on seeds, grass, fruit as well as insects. It lays 8-15 eggs and incubation lasts around 24 days undertaken by the female. Game species.

2. Τρυπόγονη (Streptopelia turtur)

Είναι πολύ μεταναστευτικό και συχνάζει τόσο σε δασωμένες όσο και γεωργικές περιοχές, αλλά και σε πάρκα.

Τρέφεται με σπόρους, φωλιάζει αρχές Μαΐου μέχρι και τον Αύγουστο και γεννά 2 άσπρα αυγά σε φωλιά, που κατασκευάζει πάνω σε δένδρα ή ψηλούς θάμνους. Η επώαση διαρκεί 13 μέχρι 14 μέρες. Θηρεύσιμο είδος.

2. Turtle Dove (Streptopelia turtur)

A migratory species which is frequently found in forested and other open country as well as parks. It feeds on seeds. It lays 2 white eggs in a nest that it makes on trees or high bushes. Incubation lasts 13-14 days. Game species.

3. Τσαλαπετεινός ή πουπουζίος (Upupa epops)

Είναι μεταναστευτικό είδος που επισκέπτεται την Κύπρο κατά την άνοιξη και το φθινόπωρο. Μερικά ζευγάρια μένουν εδώ και φωλιάζουν.

Κύριο πρακτητικό στην εμφάνιση του είναι το λοφίο της κεφαλής, που ανοίγει σαν βεντάλια.

Ζει σε ανοιχτούς χώρους με μεγάλα δένδρα, σε δασικές περιοχές, σε πάρκα και αμπελώνες. Τρέφεται κυρίως με έντομα και σπάνια με μικρές σαύρες. Γεννά 5 - 7 αυγά σε τρύπες δένδρων, δύμες και γενικά στους υπάρχουν κατόλιθης κοιλότητες για φωλισμά όπου τοίχοι και στέγες σπιτιών. Προστατευόμενο είδος.

3. Ήσσος (Upupa epops)

A migratory species visiting Cyprus during spring and autumn, but some pairs stay here to breed. This bird's main characteristic is the crest on its head which looks like a fan at will. Frequently found in open areas with large trees, forested areas, parks, vineyards etc. Feeds on insects and sometimes on small lizards. It lays 5-7 eggs in tree holes, cavities formed in piles of stones, artificial terraces and walls or roots of houses. Protected species.

4. Σκαλιφούρα (Oenanthe cypriaca)

Είναι μεταναστευτικό είδος, θεωρείται όμως ενδημικό της Κύπρου γιατί φωλιάζει μόνο εδώ και σε καμιά άλλη χώρα του κόσμου.

Ζει σε ανοιχτούς χώρους αλλά και σε δασωμένες και κατοικημένες περιοχές ούτε σε υψηλέτερα.

Τρέφεται αποκλειστικά με έντομα. Φωλιάζει σε τρύπες βράχων, πρανή δρόμων, τοίχων κλπ. Κατασκευάζει φωλιά κυπελλοειδών σχήματος και γεννά 4-5 γολάζια αυγά που επωάζονται κυρίως από το θηλυκό για 13-14 μέρες. Προστατευόμενο είδος.

4. Κυρσός Wheatear (Oenanthe cypriaca)

A migrating species considered as endemic because it breeds only in Cyprus and nowhere else in the world. Prefers open undulating terrain but also forested as well as built-up areas at a very wide range of altitudes. It feeds entirely on insects. It nests in holes of walls, terraces, road edges etc. Makes a cup-shaped nest where it lays 4-5 light blue eggs. Incubation lasts 13-14 days and is basically undertaken by the female. Protected species.

5. Πετροκότυφας (Monticola solitarius)

Είναι είδος που ζει μόνιμα στην Κύπρο αλλά παρατηρείται και κατά τις μεταναστεύσεις κυρίως την άνοιξη.

Φωλιάζει τόσο στην Οροσειρά του Τροόδους όσο και του Πενταδακτύλου.

Συγνάζει σε πετρώσεις και ορεινές περιοχές καθώς και χαλάσματα.

Τρέφεται με έντομα, σκολιόπικα και επογκάκια με φρούτα. Φωλιάζει σε τρύπες ανάμεσα σε πέτρες ή τοίχους. Γεννά 4-5 αυγά ανοικτού γαλάζιου χρώματος που επωάζει το θηλυκό για 15 μέρες περίπου. Προστατευόμενο είδος.

5. Blue Rock Thrush (Monticola solitarius)

A local resident of Cyprus but is observed during migrations too especially in spring. It nests in Pentadaktylos and Troodos mountain ranges. Frequently found in rocky faces, mainly in mountainous areas as well as in ruins. It feeds mainly on insects, worms and seasonal fruit. Nests in holes between rocks and walls. It lays 4-5 light blue eggs, which the female incubates for 15 days. Protected species.

6. Τρυπαρόσπιτη (Sylvia melanocephala)

Κοινό ενδημικό είδος της Κύπρου. Συγνάζει σε θαμνώνες τόσο κοντά στη θάλασσα όσο και σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Τρέφεται με έντομα, αράχνες και δάλα δομονόδια.

Φωλιάζει σε δάμνους και κατασκευάζει κυπελλοειδή φωλιά με χόρτα στην οποία γεννά 3-5 αυγά κρεμ με πολλά πικνά σκούρα καφέ στήγματα. Η επώαση διαρκεί 13-14 μέρες και την αναλαμβάνει το θηλυκό. Προστατευόμενο είδος.

6. Cyprus Warbler (Sylvia melanocephala)

A common endemic species of Cyprus. Mainly found in low scrub and orchards both near the sea as well as in low elevations inland. It is illustrated on the 10 pounds note. It makes a cup-shaped nest with fine grasses and lays 3-5 cream colored eggs with lots of dark brown slashes. Incubation lasts 13-14 days and is undertaken by the female. Protected species.

7. Δενδροβάτης (Certhia brachydactyla dorothae)

Ζει μόνιμα στην Κύπρο στα δάση Τροόδους και Πάφου.

Τρέφεται κυρίως με έντομα.

Φωλιάζει σε τρύπες δένδρων η σημεία του κορμού όπου ο φλοιός δημιουργεί κουφώματα. Σπάνια φωλιάζει και σε τρύπες τοίχων. Γεννά 5-7 αύγα σύμφωνα με κοκκινωτά στήγματα και η επώαση διαρκεί για 14-16 μέρες και αναλαμβάνεται από το θηλυκό. Προστατευόμενο είδος.

7. Short-Toed Tree Creeper (Certhia brachydactyla dorothae)

A permanent resident in Cyprus seen regularly at Troodos and Pafos forest areas. Feeds mainly on insects. It nests in tree holes or on trunks where the bark has created hollows and sometimes in wall holes. It lays 6-7 white eggs with red spots. Incubation lasts 13-15 days and is undertaken by the female. Protected species.

8. Σταυρομύτης (Loxia curvirostra guillemerdi)

Zει μόνιμα στην Κύπρο στις ψηλότερες περιοχές του Τροόδους. Συγνάζει σε δάση κωνοφόρων και τρέφεται με σπόρους κωνοφόρων. Η περίοδος του φωλισμάτος εξαρτάται από την περίοδο ωρίμασης των σπόρων των κωνοφόρων της περιοχής που ζει και γιατί φωλιάζει από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο. Γεννά 3-4 πρασινοκάφε αυγά με σκούρα στήγματα. Η επώαση τους γίνεται από το θηλυκό και διαρκεί 14-16 μέρες. Προστατευόμενο είδος.

8. Crossbill (Loxia curvirostra guillemerdi)

A permanent resident found in the highest areas of Troodos. Frequently found in coniferous forests and feeds mainly on coniferous tree seeds. Breeding period depends on the maturity of the seeds in the area where it lives; therefore, it may breed from January to April. It lays 3-4 brown-green eggs with dark spots. Incubation lasts 14-16 days and is undertaken by the female. Protected species.

Βοήθημα: Τα πολύτιμα που φωλιάζουν στην Κύπρο - Λούης Κουρτελλαρίδης

Reference: Nesting birds in Cyprus - Louis Kourtelaris